

LAST-RD

Lithium And
Standard Therapy in
Resistant Depression

World Health Organisation Collaborative Centre
for Research and Training in Mental Health
and Service Evaluation
University of Verona
Verona, Italy



Numero identificativo LAST: |__||__||__||__||__||__||

Iniziali del paziente (nome e cognome): |__||__||__||

Data di nascita: |__||__||/|__||__||/|__||__||__||

Sesso: M F

Nome del medico: Data: |__||__||/|__||__||/|__||__||__||

Centro reclutante:

SCHEDA FOLLOW UP – MESE 2 – COORTE randomizzata al LITIO

- ✓ Litiemia più recentemEq/L (data prelievo: |__||__||/|__||__||/|__||__||__||)
- ✓ Dose giornaliera di litio: mg/die
- ✓ Nell'ultimo mese, si sono verificati effetti avversi verosimilmente riconducibili al litio? SI' NO
Se SI', è possibile specificare quali? 1)
2); 3)
- ✓ Sono state registrate anomalie ECGrafiche, tiroidee o renali? SI' NO
Se SI', è possibile specificare quali? 1)
2); 3)
- ✓ Nell'ultimo mese quante volte è stato visto il paziente (qualsiasi tipo di contatto, litiemia compresa)?
 0 1 2 3 4 (o più)
- ✓ **Riportare qui sotto la TERAPIA FARMACOLOGICA ATTUALE, in aggiunta al litio:**

| | Farmaco | Dose (mg/die) |
|---|---------|---------------|
| Antidepressivi (*) | | |
| Antipsicotici (*) | | |
| Benzodiazepine (*) | | |
| Altri stabilizzanti dell'umore (*) | | |
| Altri farmaci (*) | | |

(*) : specificare quale farmaco o quali farmaci (se più di uno) sono utilizzati all'interno di ciascuna classe considerata.

